

Akut ukompliceret cystitis

Se [lægehåndbogen/cystitis-ukompliceret](#)

Dysuri, pollakisuri, blæretømningsbesvær, nyopstået inkontinens, smerter over blæren hos kvinder ikke gravide i frugtbar alder

Pivmecillinam 400 mg p.o. x 3 i 3 dage
eller
nitrofurantoin 50 - 100 mg p.o. x 4 i 3 dage
eller
sulfamethizol 1 g p.o. x 2 i 3 dage
eller
trimethoprim 200 mg p.o. x 2 i 3 dage.

Kompliceret cystitis

Se [lægehåndbogen/cystitis-kompliceret](#)

Se [sundhed.dk/urinvejsinfektion-hos-børn](#)

Urinstiks og D+R
Mænd, børn (ca.<16 år), gravide, komorbiditeter til stede (f.eks. diabetes), postmenopausale kvinder, patienter med anomalier i urinvejerne, recidiv indenfor 3 måneder
Hos kateterbærere skal katetret skiftes efter 2 døgn relevant behandling.

Voksne: Pivmecillinam 400 mg x 3 i 5 dage
eller trimethoprim 200 mg x 2 i 5 dage

Børn: Pivmecillinam 20 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage eller trimethoprim mikstur 6 mg/kg fordelt på 2 doser i 5 dage

Pyelonefrit

Klinisk diagnose understøttes med urin D+R og CRP.
Henvisningskriteria for børn
Se [sundhed.dk/urinvejsinfektion-hos-børn](#)

Voksne: Pivmecillinam 400 mg x 3 i 14 dage
Ved penicillinallergi: Voksne: Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dage
Se [sst.dk/vejledning-om-ordination-af-antibiotika---til-landets-læger](#)

Urinvejsinfektioner hos ældre

Se [sst.dk/urinvejsinfektioner-hos-ældre](#)

Se ovenfor.

Urinvejsinfektioner og asymptomatisk bacteriuri hos gravide

Se [sst.dk/urinvejsinfektioner-og-asymptomatisk-bakteriuri-hos-gravide-rettet](#)

Ved symptomer uanset stiks sendes urin til D+R.
Ved urinundersøgelse for asymptomatisk bakteriuri: Ved positiv leukocytter og/eller positiv nitrit sendes urin til D+R.
Ved *Streptococcus* gr. B påføres fundet vandrejournalen. Konferer evt. behandling med mikrobiolog/obstetriker. Hvis tæt på termin orienteres fødested.

Pivmecillinam 400 mg x 3 i 5 dage
Ved *Streptococcus* gr. B Penicillin V 1 mill. IE x 3 i 5-7 dage
Ved penicillinallergi eller recidiverende cystitis: Konferer med mikrobiolog

Reference: Se [ekstern.infonet.regionsyddanmark-urogenitalsystemet-2019](#) og

[dskm.dk/Antibiotikavejledning-primærsektoren-regionh-2018](#)