

# Røde morfindråber

Til patienter og pårørende

## Anvendelse

Dråberne kan anvendes ved pludselig opstået åndenød eller fortsat åndenød.  
Dråberne kan anvendes ved smerter, hvor der er brug for hurtig lindring.  
Kan desuden anvendes forebyggende før aktiviteter, der kan provokere åndenød eller smerter, ex. bad.

Morfin dråberne indeholder sprit, dette er grunden til den hurtige optagelse.  
Dråberne må på grund af spritten ikke stå ophældt i bæger, da det derved fordamper og effekten vil aftage.

## Indtagelse

Hold dråberne i munden i ca. 1 min.  
Dråberne har en lidt besk smag.  
Dette mindskes ved at tage dem med en anelse saft, vand eller på en sukkerknald.  
Dråberne opsuges til dels i mundslimhinden, resten synkes.

## Dosering

Dosering af antal dråber er lægeordineret.  
Evt. øgning i dosis aftales med lægen.  
Virkningen indtræder efter ca. 2-5 minutter.  
Dråberne må gentages efter behov.

## Bivirkninger

Bivirkninger er som ved anden Morfin, ex. forstoppelse, træthed, svimmelhed eller kvalme.

## Til orientering

De røde dråber udleveres efter behov fra Palliativt Team (afhentning). Kan bestilles på visse Apoteker.