

# Transplantation af fedtvæv

Til patienter og pårørende

## Lipofilling

Behandling med fedttransplantation tilbydes patienter, der har haft vævstab i forbindelse med fx kirurgi, strålebehandling eller ulykke, eller har kroniske sår, smerter ved ar eller andet.

### Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen bliver du undersøgt af en plastikkirurg og denne vurderer, om du er egnet til operation.

Lægen vurderer, hvorvidt operationen kan foregå i lokalbedøvelse, evt. med samtidig indgift af stærkt smertestillende medicin i en blodåre og ilt-tilskud på et næsekateter eller om der er behov for fuld bedøvelse, hvor du sover helt.

Hvis du skal i fuld bedøvelse, vil du samme dag tale med narkoselægen.

### Operationsdagen

For at forebygge infektion er det vigtigt, at du tager et bad om morgenen. Du må ikke anvende creme på kroppen.

Du skal barbere operationsfeltet hjemmefra, hvis der er behåring.

På afdelingen vil du blive klædt i sygehustøj, og for at forebygge blodpropper får du støttestrømper på. Det er nogle specielle stramme strømper, du skal have på under operationen og 14 dage efter operationen.

### Selve operationen

Operationen er principielt en enkel procedure.

Inden operationen indsprøjtes en lokalbedøvende opløsning, der udover lokalbedøvelse også indeholder stoffet adrenalin.

Adrenalin får blodkarrene til at trække sig sammen, så blødningen ved operationen mindskes.

Første del af operationen er sugning af fedt (også kaldet fedtsugning).

Gennem små hudåbninger (få millimeter) indføres metalrøret (kanylen) i fedtvævet. Røret har huller på siden og ved et kraftigt undertryk i røret, indsuges fedtvæv, når røret føres frem og tilbage i vævet.

For at nedsætte risikoen for ujævnheder i huden, fjerner man ikke alt fedtvæv.

Nu renses det udsugede fedt for blod og væv, således at det fedt, der indsprøjtes på det nye sted, får de bedste betingelser for overlevelse og godt resultat.

Anden del af operationen, som er selve indsprøjtningen af fedtet, foregår (som ved sugningen) gennem flere små åbninger i huden, som afslutningsvis lukkes med en tynd tråd.

Denne tråd skal efterfølgende fjernes hos din egen læge.

### Fysisk aktivitet

Anstrengende fysisk aktivitet bør undgås de to første uger efter operationen. Herefter stigende

# Transplantation af fedtvæv

aktivitet indtil normalniveau.

## **Smerter**

Du vil have lette til moderate smerter eller brændende fornemmelse i huden nogen tid efter operationen. Du kan hjemme tage tablet Panodil for smerterne, og ved behov udleveres stærkere smertestillende på afdelingen ved udskrivelsen. Der ses ofte misfarvning og hævelse af huden samt nedsat følesans i de fedtsugede områder.

## **Udskrivelse/ambulant kontrol**

Du skal gå til egen læge 14 dage efter operationen for at få fjernet sting.

Der er oftest brug for at gentage fedttransplantationen flere gange med nogle måneders interval for at opnå det ønskede resultat.

Har du tvivlsspørgsmål, eller hvis der opstår problemer, er du velkommen til at kontakte os!

Venlig hilsen

Personalet  
Plastikkirurgisk Ambulatorium  
Telefon 79182316