

Operation for forhudsfor snævring (circumcisio) - børn

Til patienter og pårørende

Hvad er forhudsfor snævring

I drengenes første leveår er det almindeligt, at for huden ikke kan trækkes tilbage.

Dette skyldes dels, at åbningen i for huden er for lille til, at den kan trækkes tilbage over penis-hovedet, dels ser man ofte små sammenvoksninger mellem for hudens inderside og penishovedet, der forhindrer at for huden kan trækkes tilbage.

I løbet af de første leveår bliver for huden mere løs, og hos mange drenge kan for huden efterhånden uden besvær trækkes tilbage.

Generelt forventes en dreng at kunne trække for huden tilbage fra det fyldte 6. år. Dog er der ingen regel uden undtagelser.

Operation for symptomgivende forhudsfor snævring (phimosis)

Operationen foregår i fuld bedøvelse hos børn.

Under operationen laver man enten en total eller en delvis fjernelse af for huden, afhængig af hvad problemet er.

Operationen varer cirka 20 - 30 minutter.

Efter operationen

Der kan efter operationen være smerter og ømhed i operationsområdet, især ved vandladning. Det er helt normalt og forsvinder efter få dage.

Det anbefales at I har anskaffet noget smertestillende håndkøbsmedicin som eksempelvis paracetamol, pinex eller pamol inden operationen, så det kan benyttes efter operationen. Børn må få smertestillende efter vægt op til 4 gange i døgnet.

Huden omkring penis og pung kan efter operationen være hævet og misfarvet. Det er helt normalt og forsvinder i løbet af et par uger. Forsvinder hævelsen ikke, kommer der rødme omkring såret, varme og væske eller får barnet feber, skal I tage kontakt til jeres læge.

Hold barnet i ro det første døgn

Skyl såret under rindende vand efter toiletbesøg

Anvend stramsiddende underbukser de første dage og sørg for at placere penis op ad maven.

Tråde og kontrol

Sårene er syet med opløselige tråde, som forsvinder af sig selv.

Der er normalt ikke brug for kontrol

Sygemelding

1-2 dage