

Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet

Til patienter og pårørende

Formål

Formålet med undersøgelsen er at vurdere lungernes funktion og størrelse. Derudover undersøges effekten af luftvejsudvidende medicin.

Forberedelse

For at undersøge effekten af luftvejsudvidende medicin, skal du undgå at tage følgende inhalationsmedicin før undersøgelsen:

36 timer før

Spiriva, Onbrez, Seebri, Ultibro, Eklira, Relvar, Anoro, Spiolto, Incruse, Duaklir, Trimbrow, Trelegy, Trixeo, Bevespi, Enerzair, Eklira, Braltus, Ateectura

24 timer før

Symbicort, Seretide, Innovair, Bufumix, Airflusal, Flutiform, Oxis, Foradil, Serevent, Formo, Duoresp

12 timer før

Berodual, Atrovent

6 timer før

Bricanyl, Ventoline, Airomir, Airsalb, Buventol, Salamol

Du må gerne tage anden vanlig medicin.

Hvis det ikke er muligt at undvære ovenstående medicin, kontakt venligst en af sygeplejerskerne i ambulatoriet.

Rygning, mad og drikke

Alkohol og tobak påvirker undersøgelsesresultatet, og må derfor ikke indtages 8 timer før undersøgelsen.

Undgå hård fysisk aktivitet 1 time før undersøgelsen.

Du må gerne spise og drikke normalt inden undersøgelsen, dog frarådes større måltider ca. 2 timer før.

Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår siddende.

Du skal kortvarigt puste i et mundstykke, som er forbundet til et apparat, der måler lungernes funktion. Herefter får du noget luftvejsudvidende medicin (typisk Ventoline), og efter ca. 20 minutter gentages undersøgelsen.

Varighed

Undersøgelsen varer 40 til 90 minutter.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, kan du på hverdage kontakte:

- Lunge Ambulatorium Grindsted på telefon 7918 9301
- Lunge Ambulatorium Esbjerg på telefon 7918 2671