

Værd at vide om svampemidler

Til patienter og pårørende

Svampe og svampesporer findes overalt, også hos raske mennesker. Her giver de normalt ikke anledning til sygdom.

Men svampe kan være årsag til infektion, hvis du har nedsat modstandskraft. Du er særlig i risiko for at få svampeinfektion under og efter kemoterapi.

Hvis du får en knoglemarvstransplantation stiger risikoen også for svampeinfektion. Det skyldes at behandlingen svækker dit immunforsvar.

Der findes forskellige typer svampe, f.eks. gærsvamp og skimmelsvamp.

Svampeinfektioner kan blandt andet ses i huden, mundhule, fordøjelsessystemet, lungerne og i blodet. Svampeinfektioner kan spredes via blodet til kroppens organer.

Symptomerne kan være meget forskellige. Det afhænger af hvor svampeinfektionen optræder.

Hvordan anvendes svampebehandling?

Man behandler mod svamp:

- for at forebygge, at du får svampeinfektioner - eller
- som målrettet behandling mod en bestemt svampeinfektion

Der er forskel på, hvor mange gange dagligt og hvor længe du skal tage medicinen.

Det afhænger af infektionen, og af hvilken medicin du bliver behandlet med.

Medicinen mod svamp findes både som tabletter, kapsler og mikstur. Det kan også gives som indsprøjtning i en blodåre (intravenøst).

Visse svampemidler kan man kun få som indsprøjtning.

Nedenfor er nævnt de forskellige svampemidler og deres mest almindelige bivirkninger

Forskellige svampemidler:

- Diflucan® (Fluconazol)
- Mycostatin®
- Cancidas® (Caspofungin)
- Noxafil® (Voriconazol)
- AmBisome® /Amphotericin B)

Værd at vide om svampemidler

Fluconazol (Diflucan®)

- Findes som kapsler, mikstur og som infusion.

Almindelige bivirkninger

- Kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré
- Hovedpine, hududslæt, påvirkning af leverens funktion

Mycostatin

- Findes som mikstur.

Bivirkninger ses meget sjældent

- Nogle kan få kvalme, opkastning, sure opstød, diarré og udslæt

Cancidas® (Caspofungin)

- Findes som infusion.

Meget almindelig bivirkning

- Feber

Almindelige bivirkninger

- Kuldegysninger, ledsmerter, hovedpine
- Kvalme, opkastning, diarré
- Påvirkning af leverens funktion, åndenød, lavt blodtryk, vand i lungerne, blodmangel, rødme, hududslæt, hudkløe og øget svedtendens

Noxafil® (Posaconazol)

- Findes som mikstur.

Almindelige bivirkninger

- Nedsat appetit, mundtørhed, kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré, luft fra tarmen
- Kraftsløshed, træthed, feber, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed
- Påvirkning af leverens funktion, forstyrrelse i saltbalancen, ændring i hudens følesans, hududslæt

Vfend® (Voriconazol)

- Findes som kapsler og som infusion.

Meget almindelige bivirkninger

- Synsforstyrrelser, feber, rygsmerter, hovedpine.
- Kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré.
- Gulsot, væskeophobning i arme og ben.
- Hududslæt, blod i urinen, nyresvigt.

Almindelige bivirkninger

- Influenzalignende symptomer, kraftsløshed, brystsmertter, væskeophobning, åndenød og lavt blodtryk, øget risiko for infektioner samt svimmelhed
- Gener fra mundhulen, hudgener, forstoppelse
- Påvirkning af leverens samt knoglemarvens funktion
- Angst, depression, konfusion, uro, rasteløshed, hallucinationer, rysten, ufrivillige øjenbevægelser, overfølsomhed over for lys og hårtab

Værd at vide om svampemidler

AmBisome® (Amphotericin B)

- Findes som infusion.

Meget almindelige bivirkninger

- Feber, kulderystelser, kvalme og opkastning

Almindelige bivirkninger

- Påvirkning af leverens funktion, mavesmerter, diarré
- Lavt blodtryk, udvidelse af blodkarrene, hjertebanken, bryst smerter, åndenød, lænde- og rygsmerter
- Hovedpine, udslæt og rødme

Generelt om bivirkninger ved svampebehandling

Bivirkninger ved svampemidler er meget forskellige. Nogle vil ikke opleve gener. Andre vil kunne opleve mange bivirkninger af forskellig grad.

I patientinformationen her er der nogle af de bivirkninger, som patienterne har. Det kan være, at du finder flere bivirkninger beskrevet i andet materiale.

Hvis du er generet af bivirkninger af den medicin du får, skal du ringe og tale med personalet inden du evt. ophører med medicinen.

Stop aldrig med medicinen uden kontakt til lægen.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer at tage en eller flere doser?

Tag dosis så snart du opdager, at du har glemt en dosis. Er det tæt på næste dosis, så spring den glemte dosis over - tag ikke dobbelt dosis.

Hvad gør jeg, hvis jeg kaster op?

Hvis du kaster op inden for 15 minutter, efter du har taget medicinen, skal du tage en ny dosis.

Er der gået længere tid, skal du ikke gøre noget.

Her kan du læse mere

Du kan læse mere om de enkelte præparater på medicin.dk eller apoteket.dk

På indlaegssedel.dk kan du finde indlægssedler for fleste lægemidler.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.