

Duloxetin

Til patienter og pårørende

Medicinvejledning

Du kan i denne pjece læse om den medicin, som du har fået recept på. Du kan læse om virkning og mulige bivirkninger, samt hvordan du tager medicinen.

Virkning

Duloxetin virker mod nervesmerter.

Det anvendes også til behandling af depression. Det vil stå i dit fælles medicinkort, hvorfor du får medicinen.

Dosering

Duloxetin doseres individuelt. Oftest startes med 30 mg x 1 dagligt.

Du aftaler med lægen, hvordan du skal starte behandling. CRPS-sygeplejersken hjælper dig med optrapning.

Sådan tager du Duloxetin

Tages med et glas vand

Kan tages med eller uden mad

Indholdet kan kommes på kold, blød mad

Bivirkning

Du kan opleve bivirkninger af behandlingen. Du skal ikke forvente at få alle bivirkninger. Bivirkningerne vil ofte svinde over tid, og vi har erfaring for, at dosis skal øges mere forsigtigt, hvis du oplever bivirkninger.

Mundtørhed

Kvalme

Hovedpine

Sløret syn

Træthed

Gener fra mave-tarm-kanalen i form af mavesmerter, diarré, forstoppelse, luft i maven, nedsat appetit

Muskelsmerter

Duloxetine

Søvnløshed, abnorme drømme
Nedsat lyst til sex
Gaben

Det er vigtigt, at du fortæller om de gener, du oplever. Vi ønsker at hjælpe dig godt igennem behandlingen. Det vil også være muligt at ændre behandlingen, hvis bivirkningerne er for generende.

Kontakt

Er du og dine pårørende i tvivl om noget/har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

CPRS Center Syd

Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-15.00

Sekretær: 7918 2275
telefontid: 8-11 & 13-14