

Lokal injektion med binyrebarklignende medicin

Til patienter og pårørende

Der anvendes binyrebarklignende medicin som eneste medicin eller i kombination med lokal bedøvende middel.

Formål

Formålet er at mindske betændelsen i led, slimsække, seneskeder eller senetilhæftninger. Injektionen kan også gives for at lindre eller helbrede nerveafklemning forårsaget af hævelser. Ved anvendelse af lokal injektion kan man evt. undgå opstart med tablet behandling med binyrebark lignende medicin (Prednisolon) eller tablet dosis kan reduceres.

Forholdsregler

Efter lokalinjektion med binyrebarklignende medicin skal området holdes i ro i 24 timer.

Mulige bivirkninger ved injektionen

Den alvorligste bivirkning er infektion i leddet, men ved korrekt udført injektion ses det sjældent - kun 1 gang pr. 10.000 injektioner.

Hvis der opstår ømhed, rødme, varme, hævelse, feber - Kontakt Gigt og Bindevæv Ambulatorium.

Lokale skader på brusk, sener, hud og nerver ses sjældent.

Hos 2 % ses forværring af smerterne de første timer, eventuelt op til det første døgn efter injektionen.

Hos ca. 10 % ses varme fornemmelse eller rødme i ansigtet eller på overkroppen.

Injektion med binyrebark lignende stoffer har en beskeden og helt forbigående effekt på knogleskørhed.