

Behandling med Alkeran

Til patienter og pårørende

Alkeran findes som:

- Tabletter á 2 mg

Tabletterne er overtrukket med en tynd film, så du ved berøring ikke kommer i direkte kontakt med det aktive stof. Tabletterne må derfor ikke deles.

Hvordan indtages medicinen?

Tabletterne indtages 1/2 time før morgenmaden med rigeligt væske. Samtidig fødeindtagelse nedsætter optagelsen.

Hvordan virker medicinen?

Alkeran er en form for kemoterapi. Alkeran virker direkte på cellernes, specielt kræftcellernes, evne til at dele sig. Det bevirker, at mængden af kræftceller bliver mindre eller forsvinder helt.

Dosering

Alkeranbehandlingen er meget individuel. Det mest anvendte regime er en 4 dages behandling, hvor behandlingen suppleres med binyrebarkhormon.

De mest almindelige bivirkninger

I forbindelse med 4 dages kuren, kan der ca 1 uge efter kurens afslutning opstå almen ubehag, kvalme og eventuelt opkastning. Diarré og hududslæt kan forekomme.

Herudover kan der ses en påvirkning af knoglemarvens celler med et nedsat antal blodplader, hvilket i sjældne tilfælde kan give anledning til blødning: næseblødning, blødning fra tandkød eller blod i vandet. De hvide blodlegemer kan også være nedsat, hvilket kan give øget infektionstendens i form af feber, øvre luftvejsinfektioner og blærebetændelser.

I sjældne tilfælde kan ses påvirkning af lever og lunger.

Specielle forholdsregler

Hvis der under behandlingen med Alkeran opstår feber (over 38 grader), skal du umiddelbart kontakte din læge eller vagtlæge.

Der vil så blive taget stilling til indlæggelse og påbegyndelse af antibiotikabehandling.

Hvis du har spørgsmål til din sygdom eller Alkeranbehandlingen, er du altid velkommen til at kontakte en læge eller sygeplejerske fra afdelingen.