

Pregabalin

Til patienter og pårørende

Medicinvejledning

Du kan i denne pjece læse om den medicin, som du har fået recept på. Du kan læse om virkning og mulige bivirkninger, samt hvordan du tager medicinen.

Virkning

Pregabalin virker mod nervesmerter.

Det anvendes også til behandling af epilepsi. Det vil stå i dit fælles medicinkort, hvorfor du får medicinen.

Dosering

Pregabalin doseres individuelt. Oftest startes med 75 mg x 2 dagligt.

Du aftaler med lægen, hvordan du skal starte behandling. CRPS-sygeplejersken hjælper dig med optrapning.

Bivirkning

Du kan opleve bivirkninger af behandlingen. Du skal ikke forvente at få alle bivirkninger. Bivirkningerne vil ofte svinde over tid, og vi har erfaring for, at dosis skal øges mere forsigtigt, hvis du oplever bivirkninger.

Svimmelhed

Hovedpine

Sløret syn

Træthed

Gener fra mave-tarm-kanalen i form af kvalme, diarré, forstoppelse, luft i maven

Følelsen af at være i en klokke

Koncentrationsbesvær

Nedsat lyst til sex

Øget appetit og vægtøgning. Vær derfor opmærksom på, hvad og hvor meget du spiser.

Pregabalin

Det er vigtigt, at du fortæller om de gener, du oplever. Vi ønsker at hjælpe dig godt igennem behandlingen. Det vil også være muligt at ændre behandlingen, hvis bivirkningerne er for generende.

Kontakt

Er du og dine pårørende i tvivl om noget/har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

CPRS Center Syd

Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-15.00

Sekretær: 7918 2275 telefontid: 8-11 & 13-14