

# Tablet Baklofen

Til patienter og pårørende

## Medicinvejledning

Du kan i denne pjece læse om den medicin, som du har fået recept på. Du kan læse om virkning og mulige bivirkninger samt, hvordan du tager medicinen.

## Virkning

Baklofen virker muskelafslappende.

## Dosering

Baklofen doseres individuelt. Oftest startes med 5 mg 3 gange dagligt. Du aftaler med lægen, hvordan du skal starte behandling. CRPS-sygeplejersken hjælper dig med eventuel optrapning og indstilling af vedligeholdelsesdosis.

## Sådan tager du Baklofen

Tages med et glas vand

Bør indtages i forbindelse med et måltid

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad

Det er vigtigt, at du opbevarer medicinen i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

## Bivirkning

Du kan opleve bivirkninger af behandlingen. Du skal ikke forvente at få alle bivirkninger. Bivirkningerne vil ofte svinde over tid, og vi har erfaring for, at dosis skal øges mere forsigtigt, hvis du oplever bivirkninger.

Kvalme

Uskarpt syn

Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion

Gener fra mave-tarmkanalen i form af diaré, forstoppelse, opkastning, smagsforstyrrelser, øget spytdannelse

Træthed

Muskelsmerter

Hovepine

# Tablet Baklofen

Mareridt  
Hududslæt  
Øget svedtendens

Det er vigtigt, at du fortæller om de gener, du oplever. Vi ønsker at hjælpe dig godt igennem behandlingen. Det vil også være muligt at ændre behandlingen, hvis bivirkningerne er for generende.

## **Kontakt**

Er du og dine pårørende i tvivl om noget/har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

## **CPRS Center Syd**

Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-15.00

Sekretær: 7918 2275 telefontid: 8-11 & 13-14