

Behandling med acetazolamid (Diamox)

Til patienter og pårørende

Acetazolamid anvendes til behandling af forhøjet tryk i hjernen

Præparatet

Det er velkendt, at et medikament kan virke på mere end én sygdom. Acetazolamid er udviklet til behandling af forhøjet tryk i øjnene, men har også effekt på forhøjet tryk i hjernen.

Virkningsmekanisme

Acetazolamid nedsætter produktionen af hjernevæske.

Dosis

Normalt starter man med 500-750 mg. 2-3 gange dagligt afhængig af symptomernes sværhedsgrad. Dosis kan i særlige tilfælde øges til 4000 mg. dagligt fordelt på 2-3 doser.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er træthed, prikken og stikken i hænder og fødder, nedsat appetit, smagsforstyrrelser og svimmelhed. I sjældne tilfælde kan der forekomme nyresten, nedsat nyrefunktion, sukker i urinen, alvorlig hudreaktion, overfølsomhed overfor lys, nærsynethed og høretab.

Forsigtighedsregler

Acetazolamid bør ikke anvendes ved nedsat nyre- og leverfunktion, overfølsomhed overfor sulfa-præparater, ændringer i salt- og væskebalance i kroppen og ved Addisons sygdom.

Acetazolamid kan øge virkningen af tabletter mod diabetes.

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse under graviditet. Kan om nødvendigt anvendes under amning.

Recepter

Recepter er elektroniske, og medicinen kan derfor afhentes på alle apoteker i landet. Ofte kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har og hvor mange udleveringer, der er tilbage på dem. Du kan også logge på sundhed.dk, og under "medicinkort" kan du se dine recepter.

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre udseende og navn, men indholdsstoffet og virkningen vil være den samme.

Kontakt Hovedpineambulatoriet

Det er muligt at sende sikker mail via borger.dk.

Se yderligere oplysninger på www.svs.dk/hovedpine.

Bemærk, at du skal anvende Nem-ID for at logge ind.

Du kan med fordel benytte mailfunktionen for at undgå kø på telefonen.

Du kan ringe til os på telefon 79 18 22 77. Bed om Hovedpineambulatoriets sekretær.

Behandling med acetazolamid (Diamox)

Jeg giver samtykke til, at disse oplysninger er forudsætning for fortsat behandling med Diamox i Hovedpineambulatoriet.

Dato: _____

Navn: _____

Udarbejdet i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup



Rigshospitalet