



PATIENTINFORMATION

MEDICIN: ETANERCEPT

Hvordan anvendes etanercept?

Etanercept anvendes ved behandling af leddegigt (reumatoid artrit), psoriasisgigt, hvirvelsøjlegigt (Mb. Bechterew) og andre svære gigt- og bindevævssygdomme.

Hvordan virker etanercept?

Etanercept hæmmer det betændelsesfremmende stof TNF- α (tumor necrosis factor α), der spiller en central rolle i sygdomsudviklingen. Virkningen består i, at leddenes hævelse, ømhed, stivhed og smerter aftager eller helt forsvinder. Varige skader på leddene påvirkes ikke, men medicinen er i stand til at forsinke eller helt forhindre yderligere ødelæggelse af leddene. Virkningen af etanercept indtræder efter få uger, og stoffet er virksomt hos mere end halvdelen. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 4 måneder standses behandlingen og erstattes af en anden. Virker etanercept godt, kan behandlingen videreføres i flere år.

Hvordan tages etanercept?

Etanercept indsprøjtes under huden 1 eller 2 gange om ugen. Hvis en dosis glemmes, tages ikke dobbeltdosis næste gang, men den sædvanlige ordination følges. Etanercept opbevares i køleskab (2-8 °C) og fragtes i køletaske.

Etanercept og anden medicin

Etanercept anvendes sædvanligvis samtidig med methotrexat eller anden immundæmpende medicin. Der er ikke problemer med samtidig indtagelse af anden medicin.

Bivirkninger ved etanercept

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er infektioner, fx luftvejsinfektioner, blærebetændelse eller hudinfektioner. Infektioner kan udvikles hurtigere med sparsomme symptomer, hvorfor du i tilfælde af feber eller andre tegn på infektion skal kontakte lægen straks.

En meget almindelig bivirkning er reaktioner på indstiksstedet i form af rødme og kløe. Risikoen for eventuelle langtidsbivirkninger er endnu ikke endeligt afklaret. Der har været rejst mistanke om at behandlingen kan medføre øget risiko for udviklingen af visse kræftformer, herunder lymfekræft samt hudkræft. En sådan lille risiko kan ikke udelukkes, men afventer endelig afklaring.

Forholdsregler ved planlagte operationer

På grund af risiko for infektion anbefales, at sidste etanercept-sprøjte tages 1 uge før større operationer. Du skal derfor informere den læge, der står for din behandling om eventuelt planlagte operationer, således at I i fællesskab kan finde frem til den bedst egnede behandling omkring operationstidspunktet.



Behandlingen kan genoptages efter veloverstået operation når evt. sting er fjernet og der ikke er tegn på mangelfuld sårheling eller infektion.

Svangerskabsforebyggelse, amning og graviditet

Både kvinder og mænd, der er i behandling med etanercept skal anvende svangerskabsforebyggende midler. Behandling med etanercept skal ophøre mindst 3 mdr. før planlagt graviditet.

Etanercept bør ikke anvendes under amning.

Alkohol

Under behandlingen er der ingen specielle forholdsregler vedrørende indtagelse af alkohol.

Kontrol

Behandlingen fordrer ikke speciel blodprøvekontrol. Af hensyn til anden samtidig medicinsk behandling kontrolleres blodprøver hver 4.-8. uge. I forbindelse med kontrolbesøg vurderes om etanercept har den ønskede virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger.

DANBIO styregruppe
Maj 2013