

# Røntgenundersøgelse af tyndtarmen

Til patienter og pårørende

**Røntgenundersøgelse af tyndtarmen** laves under gennemlysning. Her passerer røntgenstrålingen gennem kroppen og kan derefter ses på en skærm som levende billeder. Gennemlysning vil ofte give en højere dosis end almindelige røntgenundersøgelser.

## Forberedelser til undersøgelsen:

For at få det bedst mulige resultat af undersøgelsen må du ikke spise, drikke eller ryge fra midnat før undersøgelsesdagen. Får du daglig medicin vurderer du selv, om du har behov for at indtage medicinen sammen med et glas vand eller om du eventuelt kan vente med at få medicinen til undersøgelsen er færdig. Du må gerne medbringe medicinen til Radiologisk Afdeling.

## Hvordan foregår undersøgelsen:

Ved ankomsten skal du drikke 300 ml kold kontrast. Derefter følges kontrasten under gennemlysning gennem mavesækken og ned i tarmen. Herefter tages de nødvendige røntgenbilleder med varierende tidsinterval. Undersøgelsens varighed afhænger af hvor hurtigt kontrasten passerer gennem tarmen, men det tager som regel det meste af dagen. Det er derfor godt at medbringe læsestof.

## Efter undersøgelsen:

Efter undersøgelsen må du spise og drikke normalt. Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand, da kontrasten kan virke lettere forstoppende. Din afføring kan ligeledes have en hvidlig farve i dagene efter.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Røntgen og Scanning.