

# Rimstar (Римстар)

Для пациентов и их близких

## Применение

Римстар применяют для лечения туберкулеза. Доза рассчитывается в соответствии с весом.

Врач назначил Вам следующее: \_\_\_\_\_

## Побочные действия

Могут возникнуть побочные действия. Наиболее распространенными являются усталость, пониженный аппетит, боли в животе и тошнота, головная боль, аллергические реакции, боли в мышцах и суставах, беспокойство и судороги в ногах и стопах.

Лекарство обычно переносится без осложнений, но следует обратиться к врачу или в амбулаторию при следующих симптомах:

- Отсутствие аппетита
- Тошнота, рвота, боли в животе
- Желтизна в глазах
- Температура
- Нарушения памяти или концентрации внимания
- Перепады настроения
- Нарушение зрения, изменение цветоощущения или ослабленное зрение
- Другие симптомы

## Обратите внимание

- Римстар снижает действие метадона.
- Нельзя принимать Римстар вместе с Антабусом.
- Моча, слюна и слезная жидкость окрашиваются в красный цвет.
- Может возникнуть необходимость регулировки актуального антиэпилептического лечения при одновременном лечении Римстаром.
- Принятие большого количества алкоголя не рекомендуется при лечении Римстаром.
- Могут быть препараты, которые нельзя принимать вместе с Римстаром. Поэтому важно сообщить врачу какие другие лекарства вы принимаете.
- Действие противозачаточных таблеток и гормональных спиралей ослабевает при одновременном лечении Римстаром.

## Рекомендация по приему лекарства

Лекарство следует принимать за 1 час до еды.

## Вопросы

Если у Вас есть вопросы, связанные с лечением, Вы можете связаться с Пульманологической амбулаторией по телефону 7918 2671 с 8.00 до 14.30 по будним дням.

Лучше, если Вы позвоните или придете, чем самостоятельно остановите лечение.