

Pacemaker-implantation

Til patienter og pårørende

Hjertesygdomme

Du er indkaldt til pacemakeranlæggelse og hermed følger nogle oplysninger omkring forberedelse af operationen, samt information om indgrebet og dagene efter.

Før operationsdagen - vigtigt

Det er vigtigt, at du 3 dage før operationen holder pause med blodfortyndende medicin dvs. Marevan eller Marcoumar.

Hvis du får Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis skal du ophøre med medicinen dagen før operationen.

Alt andet vanligt medicin skal du tage som normalt.

Hvis du er klapopereret, bedes du kontakte Pacemakerambulatoriet.

På operationsdagen

Du møder på Hjerte Ambulatorium, hvor der gives information om forløbet af pacemakersygeplejersken. Der kan forekomme ventetid.

- Det er vigtigt, at du medbringer medicinliste, og gerne medicin til et par dage.
- Du må gerne spise.
- Hårene i det område på brystet, hvor pacemakeren skal indopereres, fjernes af personalet på afdelingen.
- Der lægges en lille plastikkanyle i en blodåre i den ene hånd. For at forebygge betændelse, gives der via kanylen antibiotika ca. 1 time før operationen.

Før indgrebet gives der tillige afslappende og smertestillende medicin.

Pacemaker-implantation

Selve operationen

Selve operationen foregår på Røntgen-afdelingen, hvor der er forskelligt overvågningsudstyr. Der vil hele tiden være en læge og sygeplejerske til stede, som kan forklare, hvad der foregår og svare på spørgsmål.

Efter at huden er rensset med sprit, lægges steril afdækning omkring operationsområdet, for at holde det rent. Herefter gives lokalbedøvelse, således at indgrebet ikke gør ondt. Skulle der alligevel komme smerter undervejs, er det muligt at få ekstra smertestillende medicin gennem plastikkanylen i hånden. Der laves et lille snit i huden på ca. 5 cm. Gennem et blodkar under kravebenet føres en eller to pacemakerledninger ind til hjertet og tilsluttes pacemakere. Et røntgenapparat tager billeder henover brystkassen for at sikre, at pacemakerledningerne er placeret korrekt i hjertekamrene.

Pacemakere anbringes under huden, der herefter syes sammen. Derefter sættes en forbindelse på.

Efter operationen

Efter indgrebet kommer du enten tilbage til ambulatoriet (E2) eller sengeafsnittet for Hjertesygdomme (E2), hvor du får lidt at spise og drikke.

I forbindelse med operationen vurderes det, om du må gå hjem efter ca 4 timer samme dag, eller om du skal forblive indlagt til dagen efter på E2.

Hvis du udskrives på dagen, får du udleveret en tid til kontrol af pacemakere en af de kommende dage. Beslutes det, at du skal forblive indlagt efter indgrebet, udskrives du formentlig, når pacemakere er testet dagen efter.

Risiko ved operation

- Der forekommer ofte ekstraslag, når pacemakerledningen indføres i hjertet, dette fornemmes som uro i brystet og er ganske ufarligt.
- Blødning fra operationssåret kan forekomme og give anledning til mindre blodansamling under huden. Dette forsvinder af sig selv efter et par uger.
- Et af de blodkar, der anvendes, ligger tæt på lungehinden, der kan derfor komme en luftlomme mel

Pacemaker-implantation

- patienter er det nødvendigt at fjerne denne luftlomme. Dette gøres i lokalbedøvelse, hvor der lægges et tyndt plastikrør ind i luftlommen.
- Hos mindre end 3 % af patienterne flytter pacemakerledningen sig. Det vil i sådan et tilfælde være nødvendigt at lægge den på plads igen ved en ny operation.

Når du kommer hjem

- Du må de første 3 uger efter operationen ikke løfte armen op over skulderhøjde, i den side du er opereret.
- Trådene, såret er syet med, forsvinder af sig selv efter ca. 3 uger.
- Du skal være opmærksom på såret. Bliver det rødt eller væskende, skal du henvende dig til pacemakerambulatoriet.
- Du må ikke køre bil før efter en uge.
- Du må gå almindeligt i bad på 2. dagen efter operationen.
- Du får et stykke forbinding med hjem til 2. dagen efter operationen og dagen efter igen må du fjerne forbindingen helt.

Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til Pacemakerambulatoriet og tale med en sygeplejerske. De kontaktes på telefon 7918 3138 alle hverdage mellem kl. 8-8.30.

Kontakt

Pacemakerambulatoriet ligger i forbindelse med Hjerte Ambulatorium.

Esbjerg Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Bygning E, etage 2 (følg Hovedstrøg til E. Tag elevator eller trappe til E2)