

Ilomedin (Iloprost)

Til patienter og pårørende

Ilomedin anvendes til behandling af samt forebygge sår i forbindelse med nedsat ilttilførsel til blodkar i arme og ben ved Raynauds syndrom og systemisk sklerodermi.

Hvordan virker Ilomedin?

Ilomedin virker udvidende på blodkarrene i kroppen. Stoffet er en efterligning af det hormon i kroppen, der hedder prostaglandin. Det virker udvidende på blodkarrene og hæmmer blodpladernes evne til at klumpe sig sammen. Formålet med behandlingen er at udnytte den karudvidende effekt.

Ilomedin er ikke helbredende for grundsygdommen, men har en vis smertestillende effekt, så du får mulighed for at bevæge dig mere. Hvis der er sår kan disse få en bedre mulighed for at hele.

Hvordan gives behandlingen?

Behandlingen gives i en blodåre i hånden eller i halsen. Behandlingen gives over 6 timer hver dag i alt 5-6 dage eller efter individuel lægeordination.

Under behandlingen er der tæt observation, da medicinen kan påvirke blodtrykket og evt. give andre gener. Behandlingen gives ofte ambulant, men kan kræve indlæggelse alt afhængig af bivirkninger.

Bivirkninger ved ilomedin

De hyppigste bivirkninger er ansigtsrødmen, hovedpine, kvalme evt. tynd mave. Svingninger i blodtryk, hjertebanken kan ses. For at forebygge bivirkninger gives Panodil og kvalmestillende medicin en halv time før opstart.

Ilomedin og anden medicin

Ilomedin kan forstærke virkningen af visse blodtryksnedsættende midler og blodfortyndende medicin.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning

Bør ikke anvendes under graviditet og amning.

Ilomedin og alkohol

Ingen specielle forholdsregler.

Kontrol

Før behandlingsopstart tages blodprøver. Efter behandling ingen kontrol. Efterfølgende ambulant lægekontrol aftales individuelt.

Er du i tvivl om noget, spørg lægen eller sygeplejersken i ambulatoriet.