

Behandling med Thalix (Thalidomid)

Til patienter og pårørende

Thalix findes som:

- kapsler á 50 mg

Virkning

Thalidomid hæmmer dannelsen af nye kar til tumorcellerne, som hermed ikke får ernæring og går til grunde.

Anvendelse

Thalidomid findes ikke på det danske marked, fordi præparatet er fosterbeskadigende og kan give anledning til svære misdannelser af fosteret.

Lægemiddelstyrelsen finder imidlertid, at det efter lægelig vurdering kan være berettiget at forsøge behandling med Thalidomid i særlige tilfælde.

Myelomatose er en af disse sygdomme.

Bivirkninger

På grund af den fosterbeskadigende effekt bør sikker forebyggelse af svangerskab (p-piller eller spiral) anvendes af kvinder, der er i den fødedygtige alder.

Hvis der alligevel opstår svangerskab, bør der foretages abort, da risikoen for misdannelser hos fosteret er meget høj.

Ved behandling med Thalidomid kan der desuden optræde bivirkninger i form af træthed og sløvhed, løs afføring og eventuelt forstoppelse.

Efter nogen tids behandling (uger til måneder) kan der optræde bivirkninger fra nervesystemet i form af stikkende, prikkende og eventuelt strammende fornemmelser i benene samt på hænder, nedsat følelse af berøring og stik på benene samt kraftnedsættelse i benene.

Får du sådanne bivirkninger, skal du straks henvende dig til den læge, der har ansvaret for behandlingen.

Hvis du har spørgsmål til din sygdom eller Thalidomidbehandlingen er du altid velkommen til at kontakte en læge eller sygeplejerske fra afdelingen.