

# Anlæggelse af Peritonealdialysekateter

Til patienter og pårørende

## Anlæggelse af Peritonealdialysekateter

Du skal have opereret et kateter ind i bughulen til brug ved peritonealdialyse/bughindedialyse. Denne patientinformation beskriver, hvad der skal ske. Læs det hele grundigt igennem.

Operationen foregår som regel i fuld bedøvelse men kan i enkelte tilfælde foregå i lokal bedøvelse. Du skal møde til forundersøgelse samt til operation.

### **Forberedelse inden operationen:**

#### **Mavetarmfunktion**

Det er vigtigt, for bedst muligt resultat af operationen, at du i dagene op til operationen har godt gang i afføringen.

Det er derfor vigtigt, at du tager afføringsmidlet Toilax /Dulcolax (som er medsendt) som beskrevet nedenfor. Hvis du i dagene op til operationen har lidt hård/hård mave skal du starte med Toilax/ Dulcolax 2 tabletter til aften.

Rådfør dig gerne med ambulatoriets personale.

#### **Medicin**

Hvis du tager et eller flere af følgende blodfortyndende præparater, skal du holde pause før operationen:

#### *Acetylsalicylsyre-præparater*

For eksempel Hjerdyl, Hjertemagnyl, Magnyl, Treo, Idotyl, Kodimagnyl.

Pause 1 uge før operationen.

#### *Andre*

Plavix, Persantin.

Pause 1 uge før operationen.

#### *Marevan, Marcoumar*

Hvis du får marevan/marcoumar skal der lægges en plan sammen med din ambulatorielæge for, hvordan medicineringen skal foregå.

Det er vigtigt, at INR/KFTT ligger under 1,5 før operationen.

#### *Brilique samt andre blodfortyndende præparater*

Aftales med din ambulatorielæge.

*Hvis ovenstående ikke er fulgt, vil operationen blive aflyst.*

# Anlæggelse af Peritonealdialysekateter

## **Forundersøgelse før operationen:**

Blodprøve på Klinisk Biokemisk Afdeling enten i Esbjerg, Varde eller Grindsted før du møder til forundersøgelse. Se åbningstider [her](#). Medbring hjemmeblodtryksmålinger eller indtast i Mit Sygehus. Journaloptagelse ved læge.

## **Narkosetilsyn før operationen:**

Du vil blive informeret om tidspunktet for dette.

## **Dagen før operationen:**

Afføringsmiddel Tablet Toilax/Dulcolax 5 mg om morgenen og om aftenen.

## **Fasteregler:**

Her kan du læse mere om [Fasteregler](#).

OBS: Rygning frarådes så lang tid som muligt før operationen, helst dage eller uger. Rygning giver dårlig iltoptagelse og forringer sårhelingen.

## **På operationsdagen skal du hjemmefra:**

Gå i bad og vaske dig ekstra grundigt. Vær opmærksom på, at navlen skal være ren.

Du må ikke bruge bodylotion.

Eventuelle piercinger, smykker og neglelak skal fjernes hjemmefra.

## **Møde op på Medicinsk Sengeafsnit B2.1 kl. 7**

Umiddelbart før operationen:

Sygeplejerske markerer på maven hvor kateteret skal ligge.

Snak om mavetarmfunktion og hygiejne med sygeplejerske.

Skal du tømme blæren.

Vil du få anlagt drop, hvor du vil få antibiotika.

## **Efter operationen:**

Du kan forvente at have et vist ubehag og smerter efter operationen. Du vil få smertestillende medicin efter behov.

Inden udskrivelsen får du information om operationen og efterforløbet.

## **Hjemtransport**

Du skal selv sørge for hjemtransport.

Du må ikke selv køre bil, motorcykel eller lignende indtil næste morgen.

Du kan eventuelt henvende dig til sygehusets [kørselskontor](#).

## **Efter operationen skal du være opmærksom på:**

Du kan have brug for noget smertestillende. Sørg for at have håndkøbsmedicin som pamol/pinex hjemme.

Du skal have forbindelse på maven. Forbindingen er vandtæt og du må gerne gå i brusebad, men IKKE i karbad eller spa. Undgå at bruse direkte på forbindingen.

Hvis du oplever, at forbindingen bliver fugtig af blod eller efter bad, skal du kontakte Nyre Ambulatorium, hverdage 8-15 tlf. 79182258 ellers sengeafsnit B2.1 på tlf. 79185772.

Får du smerter i maven eller smerter, ømhed, hævelse ved kateteret, skal du kontakte Nyre Ambulatorium, hverdage 8-15 tlf. 79182258 ellers sengeafsnit B2.1 på tlf. 79185772.

# Anlæggelse af Peritonealdialysekateter

Undgå fysiske anstrengelser og løft over 2 kg i 2 uger. De næste 4 uger må du løfte indtil du får ondt. Efter 4 uger må du løfte normalt.

Sørg for at have godt gang i maven, da det har betydning for kateterets placering og funktion. Hvis du ikke vanligt har afføring dagligt, anbefaler vi brug af afføringsmiddel. F.eks. Parafinolie eller tablet Perilax/Toilax/Dulcolax. Alle kan købes i håndkøb.

Du skal møde i Nyre Ambulatorium ca. 7 dage efter operationen til tilsyn af såret.

Med venlig hilsen  
Personalet i Nyre Ambulatorium