

Sentinel node biopsi (skildvagtslymfeknuden)

Til patienter og pårørende

Denne vejledning retter sig til dig, der skal have fjernet en lymfeknude i armhulen for at undersøge, om din sygdom i brystet har spredt sig.

Hvordan foregår operationen?

Operationen foretages i fuld bedøvelse.

Du får i starten af operationen et radioaktivt sporstof og et blåt farvestof sprøjtet ind omkring knuden eller brystvorten, således at skildvagtslymfeknuderne bliver fundet ved hjælp af radioaktivitet og farve. En til tre lymfeknuder bliver fjernet fra armhulen, og bliver sendt til undersøgelse. Du får svar på undersøgelsen af det fjernede væv 1-2 uger efter operationen.

Det første døgn efter operationen kan urin og afføring være blålig på grund af farvestoffet.

Hvad er risikoen ved operationen?

Der kan opstå behandlingskrævende blødning eller betændelse i operationsfeltet. Der kan være forbigående eller permanent påvirket følesans omkring arrene, og i nogle tilfælde kan følesansen være nedsat på indersiden af armen. Væskeansamling (serom) i operationsfeltet forsvinder oftest af sig selv. I meget sjældne tilfælde kan der opstå lymfødem af armen eller brystet.

Hvis man finder celleforandringer i skildvagtslymfeknuden, der viser at kræften har spredt sig, har det betydning for, hvilken operationstype og efterbehandling du skal have.

Forberedelse og forholdsregler før og efter din operation

Se patientinformationen "[Generel information om operation i brystet](#)" her.