

Prednisolon

Til patienter og pårørende

Hvordan virker medicinen?

Prednisolon er et kunstigt hormonpræparat. Det ligner det hormon, der dannes i binyrerne og har god virkning på en række sygdomme. I forbindelse med kemoterapi har Prednisolon en kvalmeforebyggende og kvalmestillende virkning, specielt når det gives sammen med andet kvalmestillende. Dosis afhænger af hvilken behandling du får og medicinen udleveres af sygeplejersken.

Prednisolon bruges også til at give mere energi og appetit i forbindelse med langvarig sygdom.

Hvordan indtages medicinen?

Tabletterne indtages med rigelig væske og lidt mad.

Hvad er de mest almindelige bivirkninger ved medicinen?

Ved kortvarig behandling i 1-5 dage er der ingen langtidsbivirkninger.

Der kan forekomme kortvarig rødme af ansigt, hals og bryst.

I nogle tilfælde ses opstemthed, søvnløshed, halsbrand, hjertebanken og humørsvingninger.

- Søvnløshed: Ved søvnløshed kan det være nødvendigt at tage en sovetablet.
- Halsbrand: Hvis du får halsbrand, kan det ofte hjælpe at drikke mælk. Du kan eventuelt også købe syreneutraliserende håndkøbsmedicin på apoteket. Hvis dette ikke hjælper, skal du henvende dig til Kræft Ambulatoriet.

Praktiske råd

Har du diabetes, skal du oplyse dette til lægen, da Prednisolon kortvarigt kan give en stigning i blodsukkeret.

Har du tendens til mavesår, skal dette også oplyses til lægen.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kontaktsygeplejerske i ambulatoriet.