

Behandling med Fludara

Til patienter og pårørende

Fludara findes som:

- Tablet á 10 mg

Hvordan virker medicinen?

Fludara er et cytostatika (kemoterapi).

Det er en medicin, der indvirker direkte på cellernes, specielt cancercellernes, evne til at dele sig. Det bevirker, at cancercellernes antal formindskes.

De raske celler påvirkes også i nogen grad under behandlingen.

Anvendelse

Fludara anvendes til behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.

Dosering

Doseringen ordineres af lægen.

Kuren gives i 3 dage hver 28. dag i alt 6 gange.

Hvordan indtages medicinen?

Tabletterne kan indtages både på fastende mave eller efter et måltid.

Pillerne skal sluges hele med vand - bør ikke tygges eller knuses.

Hele den daglige dosis skal dog indtages på samme tidspunkt.

De mest almindelige bivirkninger

Knoglemarven kan påvirkes, hvorved de røde blodlegemer (blodprocenten), de hvide blodlegemer (leukocytterne) og blodpladerne (trombocytterne) falder.

Dette kan føre til blodmangel, infektion og blødning.

Feber, kvalme, opkastning og diarré kan ses.

Andre almindeligt forekommende bivirkninger omfatter træthed, svaghed, mundbetændelse, utilpashed, ødemer, kulderystelser, nervebetændelse (perifer neuropati), synsforstyrrelser og hududslæt.

Skulle en af disse bivirkninger opstå, skal du gøre opmærksom på det ved næste ambulante besøg.

Ved feber over 38 grader eller blødning skal du kontakte en læge eller vagtlæge.

Hvis du har spørgsmål til din sygdom eller behandling er du altid velkommen til at kontakte en læge eller sygeplejerske fra afdelingen.